

威而鋼,威而鋼哪裡買,威而鋼使用心得,威而鋼推薦

首先提出使用威而鋼在試管嬰兒是美國一位試管嬰兒醫師薛爾（Sher）醫師，他發現威而鋼可提高或增加血液流灌注到子宮，而且增加子宮內膜的厚度，改善子宮內膜的品質。

如果被問到威而鋼 Viagra 跟阿斯匹林相比哪一個比較有效？薛爾醫師認為威而鋼效果可能高過阿斯匹林 Aspirin。在 1989 年他自己的薛爾試管嬰兒中心首先去量子宮內膜的厚度，並且找出有利於胚胎著床的口服藥物。

他們也訂出至少胚胎著床要 0.9 公分，這是第二級 G2，而且要有三條線，這叫做 A 級 Patter A，所以再一個第二級 A 是最適合成功的，也就是超過 0.9 公分，並且有黃金三條線 Triple line 出現這叫做二 A，如果沒有這個條件可能試管嬰兒成功率會少 5 倍。（註：子宮內膜有三條線，厚度超過 0.9 公分，比較容易懷孕威而鋼。）

因此，他們如何來讓子宮內膜厚度超過 0.9 公分，並且呈現三條線，尤其是捐卵的個案（或者是代理孕母），這一種子宮內膜的準備就非常的重要，如果你子宮內膜不到 0.9 公分，比方說 0.6 公分，可能就要把胚胎先冷凍起來，為什麼子宮內膜厚度沒有辦法厚呢，比如說她有沒有子宮內膜發炎史？

若她曾經有過生產的時候感染敗血症，或者流產手術，或子宮腺肌症，或者子宮內膜有腺體的組織，或多發性的子宮肌瘤，或者在懷孕前有使用 DES 藥物，或者病人有使用口服藥排卵藥 clomid 威而鋼，這些口服排卵藥超過三個月都會讓子宮內膜變薄。

威而鋼購買推薦：<http://viagrason.com/>

因此，排卵藥使用三個月之後要停用 4-6 個禮拜。因此，他們首先發現威而鋼他所釋放出來的一氧化氮（NO）可以讓子宮血管局部放鬆，增加子宮內膜的血流量，因此增加活產率。

所以他再 2000 年的在人類生殖期刊發表一份報告，先讓病人再試管嬰兒之前，先從陰道給予威而鋼，這四個病人以前都是子宮內膜很薄，做試管嬰兒失敗，使用威而鋼的時間，平均 8-11 天，在植入之前 5-7 天就要停止使用威而鋼，他把這一份報告因為 4 個人裡面有 3 個人懷孕，登在 2000 年 4 月份人類生殖期刊。

威而鋼,威而鋼哪裡買,威而鋼使用心得,威而鋼推薦

之候他們又收集了 105 個案例登在 2002 年的 10 月份的生育與節育期刊，這份報告裏面他們發現有 70%子宮內膜薄的因為**威而鋼**而獲得改善，子宮內膜超過 0.9 公分，懷孕率可以高達 45%，反觀，如果不到 0.9 公分的話，懷孕率才只有 2%，因為口服的威而剛，不管男人女人服用，都屬於本藥物的適應症，會先徵詢病人同意後，每天半顆，10 天共 5 顆。

威而鋼線上藥局：<http://viagrason.com/>